



ANNEXE II : INFORMATION PATIENT

RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

-La détection de sang dans les selles est réalisée pour le dépistage précoce du cancer colo-rectal. Le test permet de détecter l'hémoglobine native dans les selles.

Le recueil est réalisé de la même façon que pour la coproculture bactérienne ou l'examen parasitologique des selles

Remarque : Le test pratiqué détecte uniquement l'hémoglobine humaine à la différence du test HEMOCCULT® réalisé sur une plaquette qui lui se positive quelle que soit l'origine de l'hémoglobine.

L'alcool, l'aspirine ou d'autres médicaments irritants pour l'appareil gastro-intestinal peuvent provoquer des saignements. Leur prise doit être arrêtée au moins 48 heures avant le recueil des selles.

Un brossage des dents trop intensif est déconseillé (risque de saignement au niveau des gencives).

Chez la femme : le recueil de l'échantillon doit être éloigné de plus de 3 jours des périodes menstruelles.

Si le prélèvement ne peut pas être acheminé dès son émission, celui-ci peut être conservé quelques heures (<10h) à +4°C.

Si l'examen doit être répété sur plusieurs jours (3 jours) , transmettre chaque jour l'échantillon au laboratoire.